


# 10

## Objawów Ostrzegawczych Pierwotnego Niedoboru Odporności

Pierwotny Niedobór Odporności (PNO; Primary Immunodeficiency; PID) sprawia, że dzieci i dorośli cierpią na często nawracające lub trudne do leczenia infekcje. 1:500 osób jest dotknięta jednym ze znanych Pierwotnych Niedoborów Odporności. **Jeśli u siebie lub bliskiej ci osoby występują dwa lub więcej z poniższych objawów ostrzegawczych, porozmawiaj z lekarzem i zapytaj, czy ewentualną przyczyną tego stanu nie jest Pierwotny Niedobór Odporności.**




1 Cztery lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku.



2 Dwa lub więcej poważnych zakażeń zatok w ciągu roku.



3 Stosowanie antybiotyku przez dwa miesiące lub dłużej z niewielkim efektem.



4 Dwa lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku.




5 Nieprzybieranie na wadze lub zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka.



6 Nawracające, głębokie ropnie skóry lub innych narządów.



7 Uporczywe pleśniawki w jamie ustnej lub zakażenia grzybicze na skórze.



8 Konieczność stosowania antybiotyków dożylnych do leczenia zakażenia.



9 Dwa lub więcej zakażeń tkanek głębokich, w tym posocznica.



10 PNO w wywiadzie rodzinnym.

**jm** Jeffrey Modell Foundation | Curing PI. Worldwide.

immunoprotect

Powyższe objawy ostrzegawcze zostały opracowane przez Medyczny Komitet Doradczy Fundacji im. Jeffrey Modella. Zdecydowanie zaleca się konsultację ze specjalistami w dziedzinie pierwotnych niedoborów odporności.

© 2010 Jeffrey Modell Foundation

Lista ośrodków zajmujących się leczeniem Pierwotnych Niedoborów Odporności jest zamieszczona na stronie:

[www.immunoprotect.pl](http://www.immunoprotect.pl)